

Nur für Forschungszwecke

# TIMM10 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:11124-2-AP

3 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
11124-2-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 600 µg/ml von  
Nanodrop und 340 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG1615

GenBank-Zugangsnummer:  
BC032133

GeneID (NCBI):  
26519

Vollständiger Name:  
translocase of inner mitochondrial  
membrane 10 homolog (yeast)

Berechnete Masse:  
10 kDa

Beobachtete Masse:  
10 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Ratte

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : humanes Herzgewebe, humanes Lebergewebe

IHC : humanes Kolonkarzinomgewebe,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Rashim Pal Singh	32416059	Cell Stem Cell	WB
Wei Ou	33964586	Redox Biol	WB
Rui Huang	24817082	PLoS One	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



human heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11124-2-AP (TIMM10 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 11124-2-AP (TIMM10 antibody) at dilution of 1:50 (under 25x lens).