

Nur für Forschungszwecke

Syntaxin 4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:14988-1-AP

7 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
14988-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 400 µg/ml von
Nanodrop und 247 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG6973

GenBank-Zugangsnummer:
BC002436

GeneID (NCBI):
6810

Vollständiger Name:
syntaxin 4

Berechnete Masse:
34 kDa

Beobachtete Masse:
35-37 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:2000-1:16000

IP 0.5-4.0 ug für IP und 1:500-1:3000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Mausnierengewebe, HEK-293-Zellen, Jurkat-
Zellen, Rattennierengewebe

IP : Mausnierengewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Zhenwei Yu	32428221	Brain	WB
Jamie A Lopez	29599780	Front Immunol	WB
Emilio M Serrano-López	34147527	Int J Biol Macromol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14988-1-AP (Syntaxin 4 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-Syntaxin 4 (IP:14988-1-AP, 4ug; Detection:14988-1-AP 1:1500) with mouse kidney tissue lysate 4000ug.