

Nur für Forschungszwecke

# ALG2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15092-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
15092-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 700 µg/ml von  
Nanodrop und 367 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG4833

GenBank-Zugangsnummer:  
BC015126

GeneID (NCBI):  
85365

Vollständiger Name:  
asparagine-linked glycosylation 2,  
alpha-1,3-mannosyltransferase  
homolog (S. cerevisiae)

Berechnete Masse:  
22 kDa

Beobachtete Masse:  
47 kDa, 37 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

IHC 1:50-1:500

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-  
Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise  
kann die Antigendemaskierung auch mit  
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, humanes Plazenta-Gewebe

IHC : humanes Pankreaskarzinomgewebe,

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using 15092-1-AP (ALG2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using 15092-1-AP (ALG2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15092-1-AP (ALG2 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.