

Nur für Forschungszwecke

NDC80 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18932-1-AP

5 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
18932-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 300 µg/ml von
Nanodrop und 200 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG8065

GenBank-Zugangsnummer:
BC035617

GeneID (NCBI):
10403

Vollständiger Name:
NDC80 homolog, kinetochore
complex component (S. cerevisiae)

Berechnete Masse:
74 kDa

Beobachtete Masse:
76 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, IP, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, A2780-Zellen, humanes
Milzgewebe, Jurkat-Zellen, Maushodengewebe

IP : A2780-Zellen,

IHC : humanes Hirngewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yanwei Liu	26468983	Oncotarget	WB
Yu-Chia Chen	29606879	Onco Targets Ther	WB
Xi Chen	36105209	Front Pharmacol	WB,IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18932-1-AP (NDC80 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 18932-1-AP (NDC80 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



IP Result of anti-NDC80 (IP:18932-1-AP, 4ug; Detection:18932-1-AP 1:500) with A2780 cells lysate 960ug.