

Nur für Forschungszwecke

# ANKZF1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20447-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 20447-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC000238	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 1100 µg/ml von 55139 Nanodrop und 507 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> ankyrin repeat and zinc finger domain containing 1	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:1000-1:4000 IHC 1:50-1:500
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Berechnete Masse:</b> 726 aa, 81 kDa	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Beobachtete Masse:</b> 81 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG14285		

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IHC, WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB: BxPC-3-Zellen, COLO 320-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, MCF-7-Zellen IHC: humanes Lebergewebe,
<b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b> IF, WB	
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	
<b>Zitierte Arten:</b> Human	
<b>Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.</b>	

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Suman Rimal	34663454	Acta Neuropathol Commun	WB,IF

## Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 20447-1-AP (ANKZF1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



BxPC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20447-1-AP (ANKZF1 Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.