

CHD2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21334-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 21334-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC020810	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 1106	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:8000 IHC 1:50-1:500 IF 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: chromodomain helicase DNA binding protein 2	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 1828 aa, 211 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG15429	Beobachtete Masse: 230-250 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : HEK-293-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen IHC : Rattenhirngewebe, IF : HeLa-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Ratte	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Chromodomain helicase DNA binding protein 2 (CHD2), a member of the sucrose nonfermenting (SNF-2) protein family of epigenetic regulators, which use the energy from ATP hydrolysis to change nucleosome positioning, composition and chromatin structure (PMID: 33435571). CHD2 protein plays a critical role in embryonic development, tumor suppression and survival (PMID: 24834135). In addition, CHD2 has been proposed to prevent breast cancer initiation, and CHD2 mutations are associated with chronic lymphocytic leukemia.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21334-1-AP (CHD2 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat brain tissue slide using 21334-1-AP (CHD2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat brain tissue slide using 21334-1-AP (CHD2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CHD2 antibody (21334-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).