

Nur für Forschungszwecke

# SNAI3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21350-1-AP

2 Publikationen



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 21350-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC107058	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 200 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 333929	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500 IF 1:50-1:500
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> snail homolog 3 (Drosophila)	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 292 aa, 32 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG15722	<b>Beobachtete Masse:</b> 32-38 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IF, IHC, WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB : MCF-7-Zellen, T-47D-Zellen
<b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b> IF, WB	<b>IHC :</b> humanes Hautkrebsgewebe,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	<b>IF :</b> MCF-7-Zellen,
<b>Zitierte Arten:</b> Human	
<b>Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.</b>	

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yan Zhang	36067091	Growth Factors	WB
Jingyao Zhang	37197420	Front Oncol	WB, IF

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21350-1-AP (SNAI3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin cancer tissue slide using 21350-1-AP (SNAI3 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed MCF-7 cells using 21350-1-AP (SNAI3 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).