

Vimentin Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:**22031-1-AP**

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:	GenBank-Zugangsnummer:
22031-1-AP	BC000163
Größe:	GenID (NCBI):
150ul , Konzentration: 240 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	7431
Wirt:	Vollständiger Name:
Kaninchen	vimentin
Isotyp:	Berechneté Masse:
IgG	466 aa, 54 kDa
Immunogen Katalognummer:	Beobachteté Masse:
AG16898	57 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:2000
IHC 1:50-1:500
IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, Mausherzgewebe

IHC : humanes Ovarialkarzinomgewebe, humanes Tonsillitisgewebe

IF : humanes Nierengewebe,

Hintergrundinformationen

Vimentin, also named as VIM, belongs to the intermediate filament family. Vimentin is class-III intermediate filaments found in various non-epithelial cells, especially mesenchymal cells. Vimentin is important for stabilizing the architecture of the cytoplasm. Monocyte-derived macrophages secrete vimentin into the extracellular space in vitro. Secretion of vimentin was enhanced by the proinflammatory cytokine tumor necrosis factor-alpha (TNFA; 191160) and inhibited by the antiinflammatory cytokine IL10 (124092), suggesting that vimentin is involved in the immune response. Vimentin has specialized functions that contribute to specific dynamic cellular processes. As a phosphoprotein, 55-60 kDa of vimentin proteins can be observed due to the different phosphorylation level. Isoforms of vimentin (49 kDa and 60 kDa) had also been reported. (PMID: 8640945, 22728585).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil


Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.


Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


Ausgewählte Validierungsdaten




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor tissue slide using 22031-1-AP (Vimentin antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22031-1-AP (VIM antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human kidney tissue using Vimentin antibody (22031-1-AP) at dilution of 1:200 and Coralite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human kidney tissue using Vimentin antibody (22031-1-AP) at dilution of 1:200 and Coralite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).