

Nur für Forschungszwecke

UTX Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 23984-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
23984-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 500 µg/ml von
Nanodrop und 313 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:
AG20018

GenBank-Zugangsnummer:
BC093868

GeneID (NCBI):

7403

Vollständiger Name:

ubiquitously transcribed
tetra-trico-peptide repeat, X
chromosome

Berechnete Masse:

1401 aa, 154 kDa

Beobachtete Masse:

154 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB: COLO 320-Zellen, HepG2-Zellen

Hintergrundinformationen

KMD6A, also named UTX, mediates the removal of repressive trimethylation of histone H3, it plays a central role in the regulation of posterior development, by regulating HOX gene expression (PubMed:17851529).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23984-1-AP (UTX antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23984-1-AP (UTX antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23984-1-AP (UTX antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.