Nur für Forschungszwecke

C10orf68 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:24975-1-AP

proteintech®
Antibodies | ELISA kits | Proteins
www.ptglab.com

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
24975-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 750 μg/ml von Nanodrop und 360 μg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG21682

GenBank-Zugangsnummer:
BC125091

GeneID (NCBI):
79741

Vollständiger Name:
chromosome 10 open reading frame 68

Berechneté Masse:
628 aa, 71 kDa

Beobachteté Masse:
65 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:1000
IHC 1:50-1:500
IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IF, IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Affe, Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : A549-Zellen, COS-7-Zellen

IHC : humanes Nierengewebe,

IF : HEK-293-Zellen,

Hintergrundinformationen

chromosome 10 open reading frame 68 (C10orf68) is a 628 amino-acid protein, which may have three isoforms. The function of C10orf68 is still non-known and needs to be further studied.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 24975-1-AP (C10orf68 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24975-1-AP (C10orf68 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HEK-293 cells using 24975-1-AP (C10orf68 antibody) at dilution of 1:25 and Rhodamine-Goat anti-Rabbit IgG.