

Nur für Forschungszwecke

# ANKRD33 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25202-1-AP



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 25202-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC121153	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 700 µg/ml von Nanodrop und 373 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 341405	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> ankyryn repeat domain 33	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 452 aa, 49 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG18582	<b>Beobachtete Masse:</b> 49 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IHC, WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB: Y79-Zellen, IHC: humanes Hodengewebe,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	
<b>Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.</b>	

## Hintergrundinformationen

Ankyrin repeat domain 33 (ANKRD33), also named as C12orf7, belongs to the ankyrin repeat family and is highly expressed in retina. ANKRD33 exists as two isoforms. The isoform 1 molecular weight is 29kDa and isoform 2 is 49kDa. The function of ANKRD33 is still non-known.

## Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Y79 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25202-1-AP (ANKRD33 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 25202-1-AP (ANKRD33 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).