

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 25857-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC007448	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 29901	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: SAC3 domain containing 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 404 aa, 44 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG23026	Beobachtete Masse: 44, 31 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : COLO 320-Zellen, HeLa-Zellen, PC-3-Zellen

IHC : humanes Leberkarzinomgewebe, humanes Kolonkarzinomgewebe

Hintergrundinformationen

SAC3D1, also named as SHD1 and HSU79266. SAC3D1 is widely found in the cytoplasm, cytoskeleton, microtubule, tissue center, centrosome and spindle, involved in centrosome duplication and mitotic progression. SAC3D1 is abnormally expressed in multiple types of cancer, such as colon cancer and hepatocellular carcinoma and gastric cancer. SAC3D1 may serve as a prognostic biomarker in hepatocellular carcinoma (PMID: 30353105, 32319600). SAC3D1 has 2 isoforms with the molecular mass of 44 and 31 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25857-1-AP (SAC3D1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 25857-1-AP (SAC3D1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 25857-1-AP (SAC3D1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25857-1-AP (SAC3D1 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.