

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 26771-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC002559	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop und 200 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 51441	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500 IF 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: YTH domain family, member 2	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 62 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG25348	Beobachtete Masse: 65-70 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : Raji-Zellen, Maushirngewebe IHC : humanes Hodengewebe, IF : HepG2-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus	
Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

YTHDF2, also named as YTH domain-containing family protein 2, is a 579 amino acid protein, which contains 1 YTH domain. YTHDF2 specifically recognizes and binds N6-methyladenosine (m6A)-containing RNAs, and regulates mRNA stability. M6A is a modification present at internal sites of mRNAs and some non-coding RNAs and plays a role in the efficiency of mRNA splicing, processing and stability. YTHDF2 acts as a regulator of mRNA stability: binding to m6A-containing mRNAs results in the localization to mRNA decay sites, such as processing bodies (P-bodies), leading to mRNA degradation. YTHDF2 also acts as a promoter of cap-independent mRNA translation following heat shock stress: upon stress, relocalizes to the nucleus and specifically binds mRNAs with some m6A methylation mark at their 5'-UTR, protecting demethylation of mRNAs by FTO, thereby promoting cap-independent mRNA translation. The calculated molecular weight of YTHDF2 is 62 kDa, but the phosphorylated YTHDF2 is about 65-70 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Raji cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26771-1-AP (YTHDF2 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 26771-1-AP (YTHDF2 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using 26771-1-AP (YTHDF2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).