

Nur für Forschungszwecke

HIF3A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 27650-1-AP

Vorgestelltes Produkt

5 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
27650-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 700 µg/ml von
Nanodrop und 333 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG26574

GenBank-Zugangsnummer:
NM_022462

GeneID (NCBI):
64344

Vollständiger Name:
hypoxia inducible factor 3, alpha
subunit

Berechnete Masse:
72 kDa

Beobachtete Masse:
72 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:200-1:1000
IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : mit Cobaltchlorid behandelte HeLa-Zellen, A431-Zellen

IF : mit Tunicamycin behandelte HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

HIF3A, Hypoxia-inducible factor 3-alpha, acts as a transcriptional regulator in adaptive response to low oxygen tension (PMID:11573933, PMID:16126907, PMID:19694616, PMID:20416395, PMID:21069422). It functions as an inhibitor of angiogenesis in hypoxic cells of the cornea. HIF3A also plays a role in the development of the cardiorespiratory system. HIF3A was up-regulated by hypoxia (PMID:16775626). Multiple alternatively spliced transcript variants have been found.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiaotong Diao	35534502	Nat Commun	WB
Agné Kulyté	32180562	Mol Metab	WB
Francesca Cuomo	35096807	Front Cell Dev Biol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Cobalt Chloride treated HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27650-1-AP (HIF3A antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27650-1-AP (HIF3A antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed Tunicamycin treated HepG2 cells using 27650-1-AP (HIF3A antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27650-1-AP (HIF3A antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.