

Nur für Forschungszwecke

PSMB11 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:55143-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 55143-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_001099780	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 700 µg/ml von Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 122706	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:200-1:600 IHC 1:100-1:400
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 11	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 33 kDa	
	Beobachtete Masse: 32-35 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: FC, IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : Jurkat-Zellen, IHC : humanes Thymusgewebe,
Getestete Reaktivität: Human, Maus	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

PSMB11 belongs to the peptidase T1B family. It is a multicatalytic proteinase complex which is characterized by its ability to cleave peptides with Arg, Phe, Tyr, Leu, and Glu adjacent to the leaving group at neutral or slightly basic pH. PSMB11 has an ATP-dependent proteolytic activity. Incorporated instead of PSMB5 or PSMB8, this unit reduces the chymotrypsin-like activity of the proteasome. It plays a pivotal role in development of CD8-positive T cells. The antibody is specific to PSMB11.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55143-1-AP (PSMB11 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human thymus tissue slide using 55143-1-AP (PSMB11 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human thymus tissue slide using 55143-1-AP (PSMB11 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



1X10⁶ MCF-7 cells were intracellularly stained with 0.2 ug Anti-Human PSMB11 (55143-1-AP) and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) at dilution 1:1000 (red), or 0.2 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).