

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 67143-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC035636	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 1600 µg/ml von54518 Nanodrop und 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 54518	CloneNo.: 2F8A2
Wirt: Maus	Vollständiger Name: amyloid beta (A4) precursor protein- binding, family B, member 1 interacting protein	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:2000-1:10000 IHC 1:250-1:1000 IF 1:200-1:800
Isotyp: IgG2a	Berechnete Masse: 666 aa, 73 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG4602	Beobachtete Masse: 100 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: THP-1-Zellen, HL-60-Zellen, Jurkat-Zellen, Maushirngewebe, Raji-Zellen, Ramos-Zellen

IHC: humanes Tonsillitisgewebe,

IF: humanes Tonsillitisgewebe,

Hintergrundinformationen

APBB1IP gene encodes a Rap1-GTP-interacting adapter molecule (RIAM) which is an important protein in Rap1-mediated integrin activation and adhesion. Rap1 is a small GTPase frequently activated in tumors such as melanoma and prostate cancer. RIAM is widely expressed with high expression in thymus, spleen, lymph node, bone marrow and peripheral leukocytes. RIAM may function in the signal transduction from Ras activation to actin cytoskeletal remodeling. The observed molecular weight of RIAM is about 100 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67143-1-Ig (RIAM,APBB1P antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 67143-1-Ig (RIAM,APBB1P antibody) at dilution of 1:500 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 67143-1-Ig (RIAM,APBB1P antibody) at dilution of 1:500 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using RIAM,APBB1P antibody (67143-1-Ig, Clone: 2F8A2) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).