

# DCLK1 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:**68234-1-Ig**

## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:	GenBank-Zugangsnummer:	Reinigungsmethode:
68234-1-Ig	BC152456	Protein-G-Reinigung
Größe:	GenID (NCBI):	CloneNo.:
150ul , Konzentration: 1000 µg/ml von 9201	9201	3C12C1
Nanodrop;	Vollständiger Name:	Empfohlene Verdünnungen:
	doublecortin-like kinase 1	WB 1:5000-1:50000
Wirz:	Berechneté Masse:	IHC 1:500-1:2000
Maus	729 aa, 81 kDa	
Isotyp:	Beobachteté Masse:	
IgG1	46 kDa, 82 kDa	
Immunogen Katalognummer:		
AG17110		

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:	Positivkontrollen:
IHC, WB, ELISA	WB : Hausschwein-Hirngewebe, fetales humanes Hirngewebe, Kaninchenhirngewebe, Maushirngewebe, Rattenhirngewebe
Getestete Reaktivität:	IHC : Maushirngewebe,
Hausschwein, Human, Kaninchen, Maus, Ratte	

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

## Hintergrundinformationen


DCLK1 (Serine/threonine-protein kinase DCLK1) is also named as DCAMKL1, DCDC3A, KIAA0369 and belongs to the CAMK Ser/Thr protein kinase family. It is a microtubule-associated kinase that can undergo autophosphorylation and it also has microtubule-polymerizing activity that is independent of its protein kinase activity (PMID: 11124993). It plays a unique role in mitotic spindle integrity during early neurogenesis in radial glial cell proliferation and their radial process stability. DCLK1 is a unique marker for distinguishing tumor stem cells from intestinal normal stem cells (PMID: 23202126). This protein has 4 isoforms produced by alternative splicing with the molecular weight of 82 kDa, 81 kDa, 47 kDa and 48 kDa.

## Lagerung


Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
Lagerungspuffer:  
PBS mit 0,02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7,3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0,1% BSA

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68234-1-Ig (DCLK1 antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.



fetal human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68234-1-Ig (DCLK1 antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.

