

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti- UXT



Numéro de catalogue: 11047-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
11047-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 600 µg/ml by
Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG1513

Numéro d'acquisition GenBank:
BC008890

Identification du gène (NCBI):
8409

Nom complet:
ubiquitously-expressed transcript

MW calculé
20 kDa

MW observés:
18 kDa, 45 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:200-1:1000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000
for WB

Applications

Applications testées:
IP, WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, tissu cérébral de souris

IP : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Ubiquitously expressed transcript (UXT) is a gene transcription regulator. It can regulate androgen receptor(AR) transcription by concerting with the corepersor UR1. It is proposed a potential component of mitochondrial-associated LRPPRC, a multidomain organizer that potentially integrates mitochondria and the microtubular cytoskeleton with chromosome remodeling, for UXT increasing concentrations of UXT contributes to progressive aggregation of mitochondria and cell death potentially through its association with LRPPRC. UXT is possible a nuclear chaperone that promotes formation of the NF-kappa-B enhanceosome and which is essential for its nuclear function. It can suppresses cell transformation and mediate this function by interaction and inhibition of the biological activity of cell proliferation and survival stimulatory factors like MECOM

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Carrieri Claudia C	23064229	Nature	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11047-1-AP (UXT antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-UXT (IP:11047-1-AP, 3ug; Detection:11047-1-AP 1:300) with mouse brain tissue lysate 4000ug.