

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TADA2L



Numéro de catalogue: 11299-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11299-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1817

Numéro d'acquisition GenBank:

BC011753

Identification du gène (NCBI):

6871

Nom complet:

transcriptional adaptor 2 (ADA2 homolog, yeast)-like

MW calculé

51 aa, 5 kDa

MW observés:

51.5 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris,

IP : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu de cancer du côlon humain,

Informations générales

TADA2A is a subunit of the ADA2A-containing (ATAC) histone acetyltransferase complex, which with histone acetyltransferase activity on histones H3 and H4. It is required for the function of some acidic activation domains, which activate transcription from a distant site. It has a role in chromatin remodeling by binding at the linker region between neighbouring nucleosomes of dinucleosomes [PMID:19103755].

Publications notables

Autrice

Guelman Sebastián S

Pubmed ID

19103755

Journal

Mol Cell Biol

Application

WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11299-1-AP (TADA2L antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 11299-1-AP (TADA2L antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



IP Result of anti-TADA2L (IP:11299-1-AP, 4ug; Detection:11299-1-AP 1:300) with mouse testis tissue lysate 4000ug.