

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-VEGFR-1/FLT-1



Numéro de catalogue: **13687-1-AP** 29 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:	BC039007	Méthode de purification:
13687-1-AP		Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	2321	Dilutions recommandées:
150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;		WB 1:500-1:1000 IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB IHC 1:1000-1:4000 IF 1:10-1:100
Hôte:	fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascular permeability factor receptor)	
Lapin	IgG	
Isotype:	1338 aa, 151 kDa	
Immunogen Catalog Number:	MW calculé	
AG4558	MW observés:	
	55-60 kDa	

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
FC, IF, IHC, IP, WB, ELISA	WB : cellules HEK-293, tissu placentaire humain, tissu pulmonaire de souris
Demandes citées:	IP : cellules A549,
FC, IF, IHC, IP, WB	IHC : tissu de carcinome à cellules rénales humain,
Spécificité de l'espèce:	IF : cellules HeLa,
Humain, rat, souris	
Espèces citées:	
Humain, rat, souris	

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Vascular endothelial growth factor receptor-1 (VEGFR-1, FLT-1) is a receptor tyrosine kinase belonging to the VEGFR family. VEGF is a key regulator of physiological angiogenesis and has also been implicated in pathological angiogenesis associated with tumors, intraocular neovascular disorders and other conditions. The biological effects of VEGF are mediated by VEGFR-1 and VEGFR-2. Both the two receptors have seven immunoglobulin-like repeats in the extracellular domain, a single transmembrane region and a tyrosine kinase domain. VEGFR-1 binds VEGFA, PIGF and VEGFB, and plays an essential role in the development of embryonic vasculature, the regulation of angiogenesis, cell survival, cell migration, macrophage function, chemotaxis, and cancer cell invasion. Two isoforms of VEGFR-1 exist, a full-length transmembrane form and a short soluble form (sVEGFR-1) consisting of only the extracellular ligand-binding domain. (PMID: 12778165; 17109193; 8806634)

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Qiang Ma	31562866	Eur J Pharmacol	WB,IHC
Yun Shi	31513785	Biochem Pharmacol	WB
Jie Zhang	36266491	Mol Cell Biochem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C


*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: (1(888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)




E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.



Données de validation sélectionnées



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13687-1-AP (VEGFR-1/FLT-1 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-VEGFR-1/FLT-1 (IP:13687-1-AP, 5ug; Detection:13687-1-AP 1:500) with A549 cells lysate 3300ug.



1X10⁶ HUVEC cells were stained with 0.2ug VEGFR-1/FLT-1 antibody (13687-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 4% PFA blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1500.