

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NUP62



Numéro de catalogue: 13916-1-AP

Phare

12 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13916-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 273 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4912

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014842

Identification du gène (NCBI):

23636

Nom complet:

nucleoporin 62kDa

MW calculé

522 aa, 53 kDa

MW observés:

62 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules PC-3, cellules NIH/3T3

IP : cellules NIH/3T3,

Informations générales

NUP62 belongs to the nucleoporin NSP1/NUP62 family. It is essential component of the nuclear pore complex. The N-terminal is probably involved in nucleocytoplasmic transport. The C-terminal is probably involved in protein-protein interaction via coiled-coil formation and may function in anchorage of p62 to the pore complex. Defects in NUP62 are the cause of infantile striatonigral degeneration (SNDI). NUP62 consists of a single promoter with a CpG island and three transcribed exons. It is ubiquitously expressed, an observation compatible with its essential role in transporting cargo across the nuclear envelope. (PMID:16029492)

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Li Liu	31527085	J Biol Chem	WB
Hao-Long Zeng	29174846	Biochim Biophys Acta	WB
Tianyu Wu	36395215	Science	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



PC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13916-1-AP (NUP62 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-NUP62 (IP:13916-1-AP, 4ug; Detection:13916-1-AP 1:1000) with NIH/3T3 cells lysate 1200ug.