

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NPC1



Numéro de catalogue: 13926-1-AP

Phare

17 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue: 13926-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC063302	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 4864	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500 IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: Niemann-Pick disease, type C1	
Isotype: IgG	MW calculé: 142 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG4946	MW observés: 160-200 kDa	

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, porc, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293 non bouillies, cellules HeLa, cellules HepG2, tissu cérébral de souris non bouilli

IHC : tissu de cancer du foie humain, tissu cérébral humain, tissu placentaire humain

IF : cellules HepG2,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Niemann-Pick Type C (NPC) disease is a lysosomal storage disorder characterized by accumulation of unesterified cholesterol and other lipids in the endolysosomal system. NPC disease results from a defect in either of two distinct cholesterol-binding proteins: a transmembrane protein, NPC1, and a small soluble protein, NPC2. NPC1 or NPC2 deficiency models showed that the functions of these two proteins within lysosomes are linked closely. NPC1 is a typical transmembrane protein and contains a number of modification sites for glycosylation. Defects in NPC1 are the cause of Niemann-Pick disease type C1 which exhibits highly variable clinical phenotype. Moreover, NPC1 may play a role in vesicular trafficking in glia, a process that may be crucial for maintaining the structural and functional integrity of nerve terminals.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Junfang Lyu	28923401	Cancer Lett	WB
Guoli Li	34047913	Sci China Life Sci	WB
Jian Xiao	31144242	Sci China Life Sci	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13926-1-AP (NPC1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 13926-1-AP (NPC1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 13926-1-AP (NPC1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HepG2 cells using 13926-1-AP (NPC1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).