

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PIGK



Numéro de catalogue: 15151-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15151-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 173 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3497

Numéro d'acquisition GenBank:

BC026186

Identification du gène (NCBI):

10026

Nom complet:

phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class K

MW calculé

45 kDa

MW observés:

40-45 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, rat

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HT-1080, cellules HepG2, cellules SMMC-7721

IHC : tissu de tumeur ovarienne humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Mengyan Hu	37402721	Nat Commun	WB
Tiemei Li	37246283	Adv Sci (Weinh)	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HT-1080 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15151-1-AP (PIGK antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor using 15151-1-AP (PIGK antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor using 15151-1-AP (PIGK antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).