

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ERp57/ERp60

Numéro de catalogue: 15967-1-AP

Phare

28 Publications



Informations de base

Numéro de catalogue:	BC014433	Méthode de purification:
15967-1-AP		Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	Identification du gène (NCBI):	Dilutions recommandées:
150ul , Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop;	2923	WB 1:2000-1:16000 IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:1000-1:4000 for WB IHC 1:50-1:500 IF 1:200-1:800
Hôte:	Nom complet:	
Lapin	protein disulfide isomerase family A, member 3	
Isotype:	MW calculé	
IgG	505 aa, 57 kDa	
Immunogen Catalog Number:	MW observés:	
AG8741	57 kDa	

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
FC, IF, IHC, IP, WB, ELISA	WB: cellules A375, cellules L02, tissu hépatique de rat, tissu hépatique de souris
Demandes citées:	IP : tissu hépatique de souris,
ELISA, IF, IHC, IP, WB	IHC : tissu de cancer du poumon humain,
Spécificité de l'espèce:	IF : cellules HepG2,
Humain, rat, souris	
Espèces citées:	
Humain, porc, rat, souris	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

PDIA3, also named as P58, ER60, ERp57, ERp60, ERp61, GRP57, GRP58 and PI-PLC, is a member of the PDI family, participates in the oxidation, reduction, and isomerization of disulfide bonds for correct folding of secretory proteins before modification and transport in the endoplasmic reticulum. It is associated with apoptosis or inhibition of cancer cell growth. PDIA3 was once thought to be a phospholipase; however, it has been demonstrated that this protein actually has protein disulfide isomerase activity. It is thought that complexes of lectins and PDIA3 mediate protein folding by promoting formation of disulfide bonds in their glycoprotein substrates.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jing Sun	34650437	Front Pharmacol	WB
Xin-Yu Guo	32967966	J Biol Chem	WB
Soma Samanta	29262583	Oncotarget	WB,IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C


*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1(888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15967-1-AP (ERp57/ERp60 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




IP Result of anti-ERp57/ERp60 (IP:15967-1-AP, 4ug; Detection:15967-1-AP 1:2000) with mouse liver tissue lysate 4000ug.




WWW.PTGLAB.COM



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 15967-1-AP (ERp57/ERp60 antibody at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 15967-1-AP (ERp57/ERp60 antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



1X10⁶ HepG2 cells were stained with 0.2ug ERp57/ERp60 antibody (15967-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1500.