

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF3



Numéro de catalogue: 16950-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
16950-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 260 µg/ml by  
Nanodrop and 207 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG10578

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC013603

Identification du gène (NCBI):  
7551

Nom complet:  
zinc finger protein 3

MW calculé  
446 aa, 51 kDa

MW observés:  
47-51 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:2000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Demandes citées:  
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu ovarien de souris, cellules A2780, tissu  
testiculaire de souris

## Informations générales

ZNF3 is predicted to be involved in negative regulation of transcription by RNA polymerase II, and also involved in cell differentiation and/or proliferation.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Le Du	36789689	Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai)	WB,IHC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



mouse ovary tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16950-1-AP (ZNF3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16950-1-AP (ZNF3 antibody) at dilution of 1:2500 incubated at room temperature for 1.5 hours.