

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-COQ10A



Numéro de catalogue: 17812-1-AP

4 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

17812-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12126

Numéro d'acquisition GenBank:

BC073923

Identification du gène (NCBI):

93058

Nom complet:

coenzyme Q10 homolog A (S. cerevisiae)

MW calculé

247 aa, 28 kDa

MW observés:

20-23 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

IF 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : tissu cardiaque humain, tissu de muscle squelettique de souris

IHC : tissu hépatique humain,

IF : cellules HepG2,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Bingju Yan	30483777	Mol Med Rep	WB
Hui S Tsui	31048406	J Lipid Res	WB
Bingju Yan	28901410	Mol Med Rep	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using 17812-1-AP (COQ10A antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



human heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17812-1-AP (COQ10A antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver using 17812-1-AP (COQ10A antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver using 17812-1-AP (COQ10A antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).