

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HEPACAM



Numéro de catalogue: 18177-1-AP

21 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

18177-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 280 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12870

Numéro d'acquisition GenBank:

BC104831

Identification du gène (NCBI):

220296

Nom complet:

hepatocyte cell adhesion molecule

MW calculé

416 aa, 46 kDa

MW observés:

46-72 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, cellules HepG2, cellules MCF-7, cellules SH-SY5Y, tissu cérébral de rat, tissu hépatique de souris

IP : tissu cérébral de rat,

IHC : tissu hépatique humain,

IF : cellules MCF-7,

Informations générales

HepaCAM (hepatocyte cell adhesion molecule), also known as GlialCAM, is a single-pass type I membrane glycoprotein of 416 amino acids. It displays a typical structure of immunoglobulin (Ig)-like adhesion molecules including two extracellular Ig-like domains, a transmembrane segment, and a cytoplasmic tail. It has been shown that hepaCAM forms a cis-homodimer on the cell surface, and modulates cell-matrix interaction. It is predominantly expressed in the CNS glial cells. Defects in HEPACAM gene are the cause of megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts type 2A (MLC2A). HEPACAM has also been suggested as a tumor suppressor gene.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ting Li	33024272	Br J Cancer	IHC
Jia Tao	24324362	Int J Med Sci	WB, IF
Long Zhang	23652371	Mol. Med Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18177-1-AP (HEPACAM antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 18177-1-AP (HEPACAM Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 18177-1-AP (HEPACAM Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



mmunofluorescent analysis of MCF-7 cells, using HEPACAM antibody 18177-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye).



IP Result of anti-HEPACAM (IP:18177-1-AP, 4ug; Detection:18177-1-AP 1:500) with rat brain tissue lysate 4000ug.