

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Granulin



Numéro de catalogue: 18410-1-AP

Phare

11 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

18410-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG13178

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000324

Identification du gène (NCBI):

2896

Nom complet:

granulin

MW calculé

64 kDa

MW observés:

60-70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules A431, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules PC-3, cellules RAW 264.7, cellules THP-1, cellules U-937, salive humaine, tissu cardiaque de souris, tissu cérébral de rat, tissu pulmonaire de souris

Informations générales

GRN, also known as PGRN or PCDGF, is a cysteine-rich protein of 68.5 kDa that is typically secreted into a highly glycosylated 88 kDa form. PGRN is a unique growth factor that plays an important role in cutaneous wound healing. It has an anti-inflammatory effect and promotes cell proliferation. When PCDGF is degraded to several 6-25 kDa fragments, called granulins (GRNs) by neutrophil proteases, a pro-inflammatory reaction occurs. PGRN is widely expressed, particularly in epithelial cells, immune cells, neurons, and chondrocytes. High levels of PGRN expression have been reported in human cancers, and its expression is closely correlated with the development and metastasis of several cancers. The recent discovery that mutations in the gene encoding for pro-granulin (GRN) cause frontotemporal lobar degeneration (FTLD), and other neurodegenerative diseases leading to dementia, has brought renewed interest in progranulin and its functions in the central nervous system.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ichiro Horinokita	31640144	Int J Mol Sci	WB,IHC,IF
Lili Wang	35318322	Transl Psychiatry	WB
Junying Lan	34175324	Neuropharmacology	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18410-1-AP (Granulin antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.