

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TXK



Numéro de catalogue: 18981-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 18981-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: NM_003328	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 7294	Dilutions recommandées: IHC 1:20-1:200 IF 1:10-1:100
Hôte: Lapin	Nom complet: TXK tyrosine kinase	
Isotype: IgG	MW calculé 61 kDa	

Applications

Applications testées: IF, IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu de lymphome humain, IF : cellules HeLa, cellules HepG2
Spécificité de l'espèce: Humain	

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

TXK, also named as PTK4, is an enzyme that transfer a phosphate group from a phosphate donor, generally the phosphate of ATP, onto an acceptor amino acid in a substrate protein. By this basic mechanism, protein kinases mediate most of the signal transduction in eukaryotic cells, regulating cellular metabolism, transcription, cell cycle progression, cytoskeletal rearrangement and cell movement, apoptosis, and differentiation.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma using 18981-1-AP (TXK antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma using 18981-1-AP (TXK antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of Hela cells, using TXK antibody 18981-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).