

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UNC5C-Specific



Numéro de catalogue: 20240-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20240-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 327 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_003728

Identification du gène (NCBI):

8633

Nom complet:

unc-5 homolog C (C. elegans)

MW calculé

103 kDa

MW observés:

50 kDa, 103 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:8000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

rat

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat, tissu rénal de souris

IHC : tissu cérébral de souris,

Informations générales

UNC5C, also named as UNC5H3, belongs to the unc-5 family. It is a receptor for netrin required for axon guidance. It mediates axon repulsion of neuronal growth cones in the developing nervous system upon ligand binding. Axon repulsion in growth cones may be caused by its association with DCC that may trigger signaling for repulsion. It also involved in corticospinal tract axon guidances independently of DCC. It also acts as a dependence receptor required for apoptosis induction when not associated with netrin ligand. The antibody is specific to UNC5C.

Publications notables

Autrice

Shaista Chaudhary

Pubmed ID

36940724

Journal

Alcohol Clin Exp Res

Application

WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20240-1-AP (UNC5C-Specific antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 20240-1-AP (UNC5C-Specific antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 20240-1-AP (UNC5C-Specific antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).