

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Syncoilin



Numéro de catalogue: 25151-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25151-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1100 µg/ml by Nanodrop and 433 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18565

Numéro d'acquisition GenBank:

BC119700

Identification du gène (NCBI):

81493

Nom complet:

syncoilin, intermediate filament protein

MW calculé

482 aa, 55 kDa

MW observés:

64-68 kDa, 55 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:10000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cardiaque de souris,

IP : tissu cardiaque de souris,

IHC : tissu cardiaque de souris, tissu cardiaque humain, tissu de muscle squelettique de souris, tissu de muscle squelettique humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Maria Angels Rodríguez	30347079	Invest Ophthalmol Vis Sci	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




IP Result of anti-SYNC (IP:25151-1-AP, 4ug; Detection:25151-1-AP 1:800) with mouse heart tissue lysate 4000ug.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle tissue slide using 25151-1-AP (SYNC Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle tissue slide using 25151-1-AP (SYNC Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).




mouse heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25151-1-AP (Syncoilin antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse skeletal muscle tissue slide using 25151-1-AP (Syncoilin antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse heart tissue slide using 25151-1-AP (Syncoilin antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse heart tissue slide using 25151-1-AP (Syncoilin antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse skeletal muscle tissue slide using 25151-1-AP (Syncoilin antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).