

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SAC3D1

Numéro de catalogue:**25857-1-AP**



Informations de base

Numéro de catalogue:	BC007448	Méthode de purification:
25857-1-AP		Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	Identification du gène (NCBI):	Dilutions recommandées:
150ul , Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop;	29901	WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500
Hôte:	Nom complet:	
Lapin	SAC3 domain containing 1	
Isotype:	MW calculé	
IgG	404 aa, 44 kDa	
Immunogen Catalog Number:	MW observés:	
AG23026	44, 31 kDa	

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IHC, WB, ELISA	WB : cellules COLO 320, cellules HeLa, cellules PC-3
Spécificité de l'espèce:	IHC : tissu de cancer du foie humain, tissu de cancer du côlon humain
Humain	

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; () À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.*

Informations générales

SAC3D1, also named as SHD1 and HSU79266. SAC3D1 is widely found in the cytoplasm, cytoskeleton, microtubule, tissue center, centrosome and spindle, involved in centrosome duplication and mitotic progression. SAC3D1 is abnormally expressed in multiple types of cancer, such as colon cancer and hepatocellular carcinoma and gastric cancer. SAC3D1 may serve as a prognostic biomarker in hepatocellular carcinoma (PMID: 30353105, 32319600). SAC3D1 has 2 isoforms with the molecular mass of 44 and 31 kDa.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1(888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25857-1-AP (SAC3D1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 25857-1-AP (SAC3D1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 25857-1-AP (SAC3D1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25857-1-AP (SAC3D1 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.