

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RELL1



Numéro de catalogue: 29823-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

29823-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG31475

Numéro d'acquisition GenBank:

BC039540

Identification du gène (NCBI):

768211

Nom complet:

RELT-like 1

MW observés:

29 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat

Contrôles positifs:

WB : cellules MCF-7,

IHC : tissu cutané de rat,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Informations générales

RELT-like protein 1 (RELL1) is a member of the tumor necrosis factor (TNF) receptor family and belongs to the receptor expressed in the lymphoid tissues (RELT) family. RELT1 activates the pro-inflammatory pathway by binding to TNF receptor-related factor 1 (TRAF1). Further, RELT family members activate p38 and induce apoptosis by a mechanism distinct from that of TNF receptors (PMID: 32090861). The molecular weight of RELT1 is 29 kDa.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29823-1-AP (RELL1 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat skin tissue slide using 29823-1-AP (RELL1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).