

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-NCOA1/SRC-1



Numéro de catalogue: 51114-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue: 51114-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC111533	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 153 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 8648	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: nuclear receptor coactivator 1	
Isotype: IgG	MW calculé 1441 aa, 157 kDa	
	MW observés: 140-160 kDa	

## Applications

Applications testées:  
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules MCF-7, cellules PC-3

IHC : tissu testiculaire humain,

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 51114-1-AP (NCOA1/SRC-1 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 51114-1-AP (NCOA1/SRC-1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 51114-1-AP (NCOA1/SRC-1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).