

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-CD11c/Integrin Alpha X

Numéro de catalogue: 60258-1-Ig 16 Publications



Informations de base

Numéro de catalogue:	BC038237	Méthode de purification:
60258-1-Ig	Purification par protéine A	
Taille:	Identification du gène (NCBI):	CloneNo.:
150ul , Concentration: 3200 µg/ml by Bradford	3687	2F1C10
Nanodrop and 2000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Nom complet:	Dilutions recommandées:
Hôte:	integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit)	WB 1:500-1:2000
Mouse	MW calculé	IHC 1:10000-1:40000
Isotype:	1169 aa, 129 kDa	IF 1:500-1:2000
IgG2a	MW observés:	
Immunogen Catalog Number:	145 kDa	
AG11350		

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IF, IHC, WB, ELISA	WB : tissu splénique humain, cellules HL-60, cellules THP-1, cellules U-937
Demandes citées:	IHC : tissu d'amygdale humain, tissu d'appendice humain, tissu de cancer du foie humain, tissu de cancer du poumon humain, tissu de cancer du sein humain
IF, IHC, WB	IF : tissu d'amygdale humain, tissu d'appendice humain
Spécificité de l'espèce:	
Humain	
Espèces citées:	
Humain, porc	

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Integrins are cell adhesion receptors that are heterodimers composed of non-covalently associated α and β subunits. CD11c/Integrin alpha X is a 145-150 kDa type I transmembrane glycoprotein present on a variety of cells, including monocytes/macrophages, granulocytes, NK cells and dendritic cells. Integrin alpha X/beta 2 acts a receptor for fibrinogen and is important in monocyte adhesion and chemotaxis.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Nobutaka Hoshino	36273873	J Vet Med Sci	IF
Rodrigo Nalio Ramos	35325594	Cell	IF
Yunge Gao	33771482	Exp Cell Res	IF, IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1(888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com


This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées




Untreated and PNGase F-treated lysates of HL-60 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 60258-1-Ig (CD11c/Integrin alpha X antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours. PNGase F was obtained from Atagenix (cat.NO. ata808).


human spleen tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 60258-1-Ig (CD11c/Integrin alpha X Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 60258-1-Ig (CD11c/Integrin Alpha X antibody) at dilution of 1:20000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 60258-1-Ig (CD11c/Integrin Alpha X antibody) at dilution of 1:20000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CD11c/Integrin Alpha X antibody (60258-1-Ig, Clone: 2F1C10) at dilution of 1:1000 and Coralite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CD11c/Integrin Alpha X antibody (60258-1-Ig, Clone: 2F1C10) at dilution of 1:1000 and Coralite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).