

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Vinculin

Numéro de catalogue: 66305-1-Ig 102 Publications



Informations de base

Numéro de catalogue:	66305-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank:	BC039174	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	7414	CloneNo.:	2B5A7
Hôte:	Mouse	Nom complet:	vinculin	Dilutions recommandées:	WB 1:5000-1:50000 IHC 1:50-1:500 IF 1:50-1:500
Isotype:	IgG1	MW calculé	1133 aa, 124 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG24946	MW observés:	117 kDa		

Applications

Applications testées:	FC, IF, IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs:	
Demandes citées:	ColP, IF, IHC, WB	WB :	cellules HepG2, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HSC-T6, cellules HuH-7, cellules L02, cellules LNCaP, cellules NIH/3T3, tissu cardiaque de porc
Spécificité de l'espèce:	Humain, porc, rat, souris	IHC :	tissu de cancer du sein humain, tissu de cancer de la prostate humain
Espèces citées:	Humain, poisson-zèbre, porc, rat, souris, Hamster	IF :	cellules HeLa,
<i>Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.</i>			

Informations générales

Vinculin belongs to the vinculin/alpha-catenin family. It is an actin filament (F-actin)-binding protein which involved in cell-matrix adhesion and cell-cell adhesion. Vinculin regulates cell-surface E-cadherin expression and potentiates mechanosensing by the E-cadherin complex. It may also play important roles in cell morphology and locomotion. Vinculin is a 117-kDa, 1,066-amino-acid protein which is ubiquitously expressed. Its splice variant, metavinculin (124 kDa), is muscle-specific.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Juan M Barajas	34599880	Am J Pathol	WB
Tingben Huang	36167235	Acta Biomater	IF
Yizhou Zhu	31507175	ACS Appl Mater Interfaces	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C


*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1(888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)



E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66305-1-Ig (Vinculin antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 66305-1-Ig (Vinculin Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).

Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 66305-1-Ig (Vinculin Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HeLa cells using 66305-1-Ig (Vinculin antibody) at dilution of 1:200 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).



1X10⁶ HeLa cells were stained with 0.2ug Vinculin antibody (66305-1-Ig, red) and control antibody (blue). Fixed with 4% PFA blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L) with dilution 1:1500.