

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Hsc70

Numéro de catalogue: 66442-1-Ig

Phare

6 Publications



Informations de base

Numéro de catalogue:	BC007276	Méthode de purification:
66442-1-Ig		Purification par protéine A
Taille:	Identification du gène (NCBI):	CloneNo.:
150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	3312	1A4B3
Hôte:	Nom complet:	Dilutions recommandées:
Mouse	heat shock 70kDa protein 8	WB 1:20000-1:100000 IHC 1:50-1:500
Isotype:	MW calculé	
IgG1	70 kDa	
Immunogen Catalog Number:	MW observés:	
AG17910	70 kDa	

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IHC, WB, ELISA	WB : cellules LNCaP, cellules 4T1, cellules C6, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules HSC-T6, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules NIH/3T3, cellules RAW 264.7, cellules ROS1728, Protéine recombinante
Demandes citées:	
IF, WB	
Spécificité de l'espèce:	IHC : tissu de tumeur ovarienne humain,
Humain, rat, souris	
Espèces citées:	
Chèvre, Humain, porc, souris	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

HSPA8 (also known as HSC70) is a member of the HSPA (HSP70) family of heat-shock proteins which are highly conserved chaperons implicated in protein folding, protein refolding, protein transport, and protein targeting. HSPA8 is a constitutively expressed cytosol/nuclear protein able to translocate between cytoplasm and nucleus. Recently it has been reported that HSPA8 can interact with α-synuclein, the critical pathological protein of Parkinson's disease, indicating its implication in neurodegenerative disease. (PMID: 21832061)

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zhipeng Sun	36499219	Int J Mol Sci	WB
Yongjie Wang	33761934	Cell Commun Signal	WB
Maya Suzuki	36648092	FEBS Open Bio	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C


*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1(888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.



Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66442-1-Ig (Hsc70 antibody) at dilution of 1:50000 incubated at room temperature for 1.5 hours.





Western blot analysis of Hsc70 in various cell lines using 66442-1-Ig (Hsc70 Antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



6^{His} tagged-recombinant HSP70 (291-641 aa) and HSC70 (346-646 aa) proteins were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66183-1-Ig (HSP70 antibody), 66442-1-Ig (HSC70 antibody), and 66005-1-Ig (His antibody), respectively, at dilution of 1:50000, incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of Hsc70 antibody (66442-1-Ig; 1:12000) with sh-Control and sh-Hsc70 transfected HEK-293 cells.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor tissue slide using 66442-1-Ig (Hsc70 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).