

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-NUP62

Numéro de catalogue: 66573-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 66573-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC014842	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul, Concentration: 1400 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 23636	CloneNo.: 2G12B3
Hôte: Mouse	Nom complet: nucleoporin 62kDa	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:10000 IHC 1:1000-1:4000
Isotype: IgG1	MW calculé: 522 aa, 53 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG4912	MW observés: 62 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules DU 145, cellules HepG2, cellules PC-3, cellules Raji, cellules RAW 264.7

IHC : tissu de cancer de la prostate humain,

Informations générales

NUP62 belongs to the nucleoporin NSP1/NUP62 family. It is essential component of the nuclear pore complex. The N-terminal is probably involved in nucleocytoplasmic transport. The C-terminal is probably involved in protein-protein interaction via coiled-coil formation and may function in anchorage of p62 to the pore complex. Defects in NUP62 are the cause of infantile striatonigral degeneration (SNDI). NUP62 consists of a single promoter with a CpG island and three transcribed exons. It is ubiquitously expressed, an observation compatible with its essential role in transporting cargo across the nuclear envelope. (PMID:16029492)

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66573-1-Ig (NUP62 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer tissue slide using 66573-1-Ig (NUP62 antibody) at dilution of 1:2000 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer tissue slide using 66573-1-Ig (NUP62 antibody) at dilution of 1:2000 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).