

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-ACSL4

Numéro de catalogue: 66617-1-Ig

Phare

10 Publications



## Informations de base

Numéro de catalogue: 66617-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC034959	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul, Concentration: 1800 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 2182	CloneNo.: 1H5D3
Hôte: Mouse	Nom complet: acyl-CoA synthetase long-chain family member 4	Dilutions recommandées: WB 1:3000-1:10000 IHC 1:250-1:1000
Isotype: IgG1	MW calculé 711 aa, 79 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG18085	MW observés: 74 kDa	

## Applications

### Applications testées:

FC, IHC, WB, ELISA

### Demandes citées:

WB

### Spécificité de l'espèce:

Humain

### Espèces citées:

Humain, rat

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

### Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules Caco-2, cellules COLO 320, cellules HepG2, cellules HT-29, cellules L02

IHC : tissu de cervelet humain,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yongfei He	34790741	Ann Transl Med	WB
Dalong Wang	36331006	Phytother Res	WB
Tian-Xiang Wang	36319062	Life Sci Alliance	

## Stockage

### Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

### Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66617-1-Ig (ACSL4 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cerebellum tissue slide using 66617-1-Ig (ACSL4 antibody) at dilution of 1:500 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cerebellum tissue slide using 66617-1-Ig (ACSL4 antibody) at dilution of 1:500 (under 40x lens).



1X10<sup>6</sup> HEK-293T cells were intracellularly stained with 0.4 ug Anti-Human ACSL4 (66617-1-Ig, Clone:1H5D3) and CoraLite@488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L) at dilution 1:1000 (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).



WB result of ACSL4 antibody (66617-1-Ig; 1:3000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-ACSL4 transfected HepG2 cells.