

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-EIF4E

Numéro de catalogue: 66655-1-Ig

Phare

2 Publications



Informations de base

Numéro de catalogue:	66655-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank:	BC012611	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	150ul , Concentration: 1400 µg/ml by 1977 Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI):	Nom complet: eukaryotic translation initiation factor 4E	CloneNo.:	3C6B9
Hôte:	Mouse	MW calculé	29 kDa	Dilutions recommandées:	WB 1:5000-1:50000 IHC 1:2500-1:10000 IF 1:50-1:500
Isotype:	IgG1	MW observés:	26-29 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG27191				

Applications

Applications testées:	FC, IF, IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs:	WB : cellules Jurkat, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HSC-T6, cellules LNCaP, cellules MCF-7, cellules NIH/3T3, cellules RAW 264.7, cellules U2OS
Demandes citées:	IHC, WB	IHC :	tissu de cancer du sein humain,
Spécificité de l'espèce:	Humain, rat, souris	IF :	cellules HepG2,
Espèces citées:	Humain, souris		
<i>Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.</i>			

Informations générales

Eukaryotic translation initiation factor 4E, also known as eIF4E, is a protein that in humans is encoded by the EIF4E gene. eIF4E is the mRNA cap-binding protein, known as a general initiation factor allowing for mRNA-ribosome interaction and cap-dependent translation in eukaryotic cells. eIF4E is a polypeptide that exists as both a free form and as part of the eIF4F pre-initiation complex. Regulation of eIF4E may be achieved via three distinct mechanisms: transcription, phosphorylation, and inhibitory proteins.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Shasha Zhao	35768165	J Immunother Cancer	WB
Xiao Ke	35802246	Neurosci Bull	WB,IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C


*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1(888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)




E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66655-1-Ig (EIF4E antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.



WB result of EIF4E antibody (66655-1-Ig; 1:10000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-EIF4E transfected HEK-293 cells.



1X10⁶ HepG2 cells were intracellularly stained with 0.2 ug Anti-Human EIF4E (66655-1-Ig, Clone:3C6B9) and Coralite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L) at dilution 1:1000 (red), or 0.2 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66655-1-Ig (EIF4E antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.