

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-TRAF4

Numéro de catalogue: 66755-1-Ig

Phare

2 Publications



## Informations de base

Numéro de catalogue:	BC001769	Méthode de purification:
66755-1-Ig		Purification par protéine A
Taille:	Identification du gène (NCBI):	CloneNo.:
150ul , Concentration: 1700 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	9618	2C9A11
Hôte:	Nom complet:	Dilutions recommandées:
Mouse	TNF receptor-associated factor 4	WB 1:1000-1:6000
Isotype:	MW calculé	IHC 1:200-1:800
IgG1	54 kDa	IF 1:50-1:500
Immunogen Catalog Number:	MW observés:	
AG27221	50-54 kDa	

## Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IF, IHC, WB, ELISA	WB : cellules Jurkat, cellules Daudi, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules NCCIT, cellules Raji, cellules Ramos, cellules THP-1, cellules U-937, tissu cérébral de porc, tissu cérébral humain, tissu splénique de porc
Demandes citées:	IHC : tissu de carcinome urothélial humain, tissu de cancer du poumon humain, tissu de cancer du sein humain
IF, WB	IF : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce:	
Humain, porc	
Espèces citées:	
Humain, souris	
<i>Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.</i>	

## Informations générales

The tumor necrosis factor receptor-associated factor (TRAF) family, consisting of seven members (TRAF1-7), is a group of signaling adaptors which participate in various signaling pathways through binding of the tumor necrosis factor receptor superfamily. As one of the important member of TRAF family proteins, TRAF4 was initially isolated from breast carcinomas and identified as the first member of the TRAF family to be up-regulated in human carcinomas. TRAF4 is required during embryogenesis in key biological processes including the formation of the trachea, the development of the axial skeleton, and the closure of the neural tube. TRAF4 deficiency leads to severe developmental alterations.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Hongyu Gu	36077559	Int J Mol Sci	WB, IF
Jun Zhou	32304412	Anticancer Drugs	WB

## Stockage

### Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

### Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C


\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1(888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)




E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66755-1-Ig (TRAF4 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 66755-1-Ig (TRAF4 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66755-1-Ig (TRAF4 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.