

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-GRP75

Numéro de catalogue: 67563-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67563-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC000478	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul, Concentration: 1800 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 3313	CloneNo.: 2B12F2
Hôte: Mouse	Nom complet: heat shock 70kDa protein 9 (mortalin)	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:500-1:2000
Isotype: IgG2a	MW calculé: 74 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG7125	MW observés: 75 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules 4T1, cellules HEK-293, cellules HSC-T6, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules NIH/3T3

IHC : tissu de cancer du sein humain,

Informations générales

GRP75 (also known as mortalin, HSPA9 or mt-Hsp70) is a constitutively expressed member of the HSPA (HSP70) family of heat-shock proteins. It is located in the mitochondrial matrix and anti-GRP75 is commonly used as the marker for mitochondria. It has been reported that GRP75 is enriched in cancer cells and contributes to carcinogenesis. In addition, decreased expression level of GRP75 has been found in neurodegenerative disorders like Parkinson's disease. (PMID: 21640711, 22920904)

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67563-1-Ig (GRP75 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 67563-1-Ig (GRP75 antibody) at dilution of 1:1000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).