

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-VPS18

Numéro de catalogue: 67590-1-Ig



## Informations de base

Numéro de catalogue:	BC001513	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	Identification du gène (NCBI):	CloneNo.:	2E10G11
150ul , Concentration: 1700 µg/ml by Bradford Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Nom complet: vacuolar protein sorting 18 homolog (S. cerevisiae)	Dilutions recommandées:	WB 1:5000-1:50000 IHC 1:500-1:2000 IF 1:50-1:500
Hôte:	MW calculé		
Mouse	110 kDa		
Isotype:	MW observés:		
IgG2a	100-110 kDa		
Immunogen Catalog Number:			
AG29954			

## Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IF, IHC, WB,ELISA	WB : cellules A549, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules HSC-T6, cellules Jurkat, cellules K-562
Spécificité de l'espèce:	IHC : tissu de cancer du foie humain,
Humain, rat	IF : cellules A549,
<b>Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.</b>	

## Informations générales

Vesicle mediated protein sorting plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. Vps18 is a central member of Vps-C complex. Vps18 may play a role in vesicle-mediated protein trafficking to lysosomal compartments and in membrane docking/fusion reactions of late endosomes/lysosomes.

## Stockage


Stockage:  
Stocker à -20 °C.  
Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.



For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1(888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67590-1-Ig (VPS18 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 67590-1-Ig (VPS18 antibody) at dilution of 1:1000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).

Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 67590-1-Ig (VPS18 antibody) at dilution of 1:1000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed A549 cells using VPS18 antibody (67590-1-Ig, Clone: 2E10G11) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).