

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-DIS3L2

Numéro de catalogue: 67623-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67623-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC030113	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul , Concentration: 2000 µg/ml by Nanodrop and 752 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 129563	CloneNo.: 2C9F2
Hôte: Mouse	Nom complet: DIS3 mitotic control homolog (S. cerevisiae)-like 2	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000
Isotype: IgG1	MW calculé: 885 aa, 99 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG29992	MW observés: 65 kDa, 99 kDa	

Applications

Applications testées:
FC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules U2OS, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules HSC-T6, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules LNCaP, cellules NIH/3T3

Informations générales

DIS3L2 encodes a protein of 885 amino acids with a predicted molecular weight of 99.3 kDa.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ Jurkat cells were stained with 0.2 ug Anti-Human DIS3L2 (67623-1-Ig, Clone:2C9F2) and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L) at dilution 1:1000 (green), and 0.2 ug Control Antibody. Cells were fixed with 90% MeOH.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67623-1-Ig (DIS3L2 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated Lamin B1 Monoclonal antibody (HRP-66095) as loading control.