

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-TK1

Numéro de catalogue: 67787-1-Ig

1 Publications



Informations de base

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Numéro de catalogue: | 67787-1-Ig | Numéro d'acquisition GenBank: | BC007986 | Méthode de purification: | Purification par protéine A |
| Taille: | 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop; | Identification du gène (NCBI): | 7083 | CloneNo.: | 1B1C2 |
| Hôte: | Mouse | Nom complet: | thymidine kinase 1, soluble | Dilutions recommandées: | WB 1:2000-1:10000 IHC 1:250-1:1000 |
| Isotype: | IgG2a | MW calculé | 25 kDa | | |
| Immunogen Catalog Number: | AG8265 | MW observés: | 25 kDa | | |

Applications

| | | | |
|--|----------------|---------------------|---|
| Applications testées: | IHC, WB, ELISA | Contrôles positifs: | |
| Demandes citées: | IF, IHC, WB | WB : | cellules HeLa, cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules Raji, cellules THP-1 |
| Spécificité de l'espèce: | Humain | IHC : | tissu de cancer du côlon humain, |
| Espèces citées: | Humain | | |
| <i>Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.</i> | | | |

Informations générales

TK1(Thymidine kinase, cytosolic) belongs to the thymidine kinase family and is a regulatory enzyme that can interchange between its dimeric and tetrameric forms, which have low and high catalytic efficiencies, respectively. TK1 is involved in DNA synthesis and an important proliferation marker(PMID:21178264).

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|-----------|-----------|----------------|-------------|
| Ning Wang | 36806253 | Cell Death Dis | WB,IHC,IF |

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C


*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1(888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)




E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67787-1-Ig (TK1 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated Beta Actin Monoclonal antibody (HRP-66009) as loading control.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67787-1-Ig (TK1 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67787-1-Ig (TK1 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.