

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-AIF

Numéro de catalogue: 67791-1-Ig

Phare

2 Publications



## Informations de base

Numéro de catalogue: 67791-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC111065	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 9131	CloneNo.: 8C12B2
Hôte: Mouse	Nom complet: apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 1	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:1000-1:4000 IF 1:200-1:800
Isotype: IgG2a	MW calculé 609 aa, 66 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG12400	MW observés: 67 kDa, 57 kDa	

## Applications

### Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

### Demandes citées:

WB

### Spécificité de l'espèce:

canin, Humain, porc, rat, souris

### Espèces citées:

Humain, rat

### Contrôles positifs:

WB : cellules LNCaP, cellules cérébrales de porc, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HSC-T6, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules MDCK, cellules NIH-3T3

IHC : tissu rénal humain,

IF : cellules HeLa, tissu rénal humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

Apoptosis-inducing factor (AIF) is one of the mitochondrial proteins to be released into the cytosol during apoptosis, and it is discovered as the first protein that regulates caspase-independent apoptosis (PMID:20494118). AIF is encoded as a 67 kDa protein that contains a mitochondrial localization signal (MLS) in the N-terminus. It is cleaved from the 62 kDa to the 57 kDa form following ischemic injury and translocated from the mitochondria to the nucleus in a calpain-dependent manner (PMID:19332058).

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zhongren Xu	35671636	Redox Biol	WB
Kai Li	36856879	Inflammation	WB

## Stockage

### Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

### Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67791-1-Ig (AIF antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 67791-1-Ig (AIF antibody) at dilution of 1:2000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 67791-1-Ig (AIF antibody) at dilution of 1:2000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using AIF antibody (67791-1-Ig, Clone: 8C12B2) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using AIF antibody (67791-1-Ig, Clone: 8C12B2) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).



WB result of AIF antibody (67791-1-Ig; 1:40000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-AIF transfected HeLa cells.